

Día Nacional de Concientización sobre el VIH y SIDA en la población afro-americana 7 de febrero, 2018

El Día Nacional de Concientización sobre el VIH y SIDA en la población afro-americana (NBAHAAD, por sus siglas en inglés) fue conmemorado por primera vez en 1999. El tema del Día Nacional de la Prevención del VIH/SIDA para la población afro-americana es "*Soy el guardián de mi hermano y mi hermana. ¡Lucha contra el VIH/SIDA!*". Educar, Examinarse, Involucrarse y Tratar son las metas de la NBAHAAD.

En los Estados Unidos

- ⚡ Los afro-americanos componen casi la mitad de todos los nuevos diagnósticos cada año, a pesar de representar sólo el 12% de la población de los E.U.A.
- ⚡ A nivel nacional, uno de cada dos hombres afro-americanos gay será diagnosticados con el VIH a lo largo de sus vidas.
- ⚡ En los últimos años, la tasa de VIH entre las mujeres afro-americanas en los E.U.A. ha disminuido.
- ⚡ Más de la mitad de las personas transgénero diagnosticados con VIH son afro-americanas.
- ⚡ Los afro-americanos son más propensos de morir de VIH/SIDA en comparación con otros grupos.

En Luisiana




- ⚡ En Luisiana, desde el 31 de diciembre de 2017, 14,932 personas afro-americanas viven con la infección del VIH; 5,127 (34 %) son mujeres, 9,611 (64%) son hombres y 193 (1%) son mujeres transgénero.
- ⚡ Los afro-americanos componen el 32% de la población del estado, sin embargo, en el 2017
 - el 66 % de casos nuevos de VIH afecta a los afro-americanos y el 70% de casos nuevos de SIDA afecta a los afro-americanos
 - el 68% de todas las personas que viven con VIH son afro-americanas.
- ⚡ En todas las regiones de Luisiana, el porcentaje de personas que vive con la infección del VIH que forma parte de la población afro-americana es considerablemente más alta que el porcentaje de la población general que es afro-americana.
- ⚡ Entre los hombres, el 64% de todos los nuevos diagnósticos de VIH son afro-americanos. Entre las mujeres, el 76% de todos los nuevos diagnósticos de VIH son mujeres afro-americanas y entre las mujeres transgénero, el 69% de todos los nuevos diagnósticos de VIH son afro-americanas.
- ⚡ En 2017, los diagnósticos de VIH para las personas de color eran casi cinco veces más altos que los diagnósticos de VIH para las personas blancas. Los diagnósticos de VIH en mujeres afro-americanas eran casi 8 veces más altos que los diagnósticos de VIH en mujeres blancas y los diagnósticos de VIH en hombres afro-americanos es cuatro veces más altos que los diagnósticos de VIH en hombres blancos.
- ⚡ De los diagnósticos nuevos de VIH entre las personas afro-americanas en Luisiana, el 63% son gay, bisexuales y hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), el 7% son usuarios de drogas inyectables (UDI), el 2% son HSH/UDI y el 28% son heterosexuales de alto riesgo.
- ⚡ En los últimos cinco años, 76 mujeres afro-americanas transgénero han sido diagnosticadas con VIH. Para finales de 2017, había 193 mujeres afro-americanas transgénero con VIH en Luisiana.

Para más información sobre NHBAAD visite nationalblackaidsday.org o hiv.gov.

Para más información sobre el VIH en Luisiana o para localizar un centro de pruebas de VIH, visite lahhub.org


Día Nacional de Concientización sobre el VIH y SIDA en la población afro-americana 7 de febrero, 2018


El VIH en los niños:


-  Un total de 2,322 niños (menores de 13 años a finales de 2015) están infectados con el VIH en los E.U.A., el 81% de los niños fueron infectados mediante la transmisión madre a hijo (infección perinatal).
-  En los E.U.A., del 52% de los niños menores de 13 infectados con el VIH en el 2015, por medio de la transmisión perinatal eran niños afro-americanos, el 12% eran niños hispanos/latinos y el 9% eran niños blancos.
-  En Luisiana, 161 niños nacieron de madres infectadas con el VIH y expuestas al VIH en el 2015; el 90% era niños afro-americanos. En los últimos 5 años, el 89% de todos los niños infectados mediante la transmisión perinatal, eran niños afro-americanos.

Nuevos diagnósticos de VIH entre las personas afro-americanas en Luisiana *Por Regiones de Salud Pública*

	Mujeres afro-americanas 2017	Hombres afro-americanos 2017	Mujeres transgénero (Combinados 2013—2017)
Nivel Estatal	198 (100%)	556 (100%)	76 (100%)
1: New Orleans	59 (30%)	177 (32%)	31 (41%)
2: Baton Rouge	55 (28%)	133 (24%)	17 (22%)
3: Houma	4 (2%)	26 (5%)	3 (4%)
4: Lafayette	15 (8%)	44 (8%)	4 (5%)
5: Lake Charles	8 (4%)	22 (4%)	2 (3%)
6: Alexandria	9 (5%)	14 (3%)	2 (3%)
7: Shreveport	21 (11%)	79 (14%)	6 (8%)
8: Monroe	11 (6%)	34 (6%)	4 (5%)
9: Hammond/Slidell	16 (8%)	27 (5%)	7 (9%)

 De todos los diagnósticos nuevos de VIH entre los hombres y mujeres de la población afro-americana, el 56 % proviene de las regiones de Nueva Orleans y Baton Rouge.

 Más del 60% de los diagnósticos de VIH entre las mujeres afro-americanas transgénero se registran en Nueva Orleans y en Baton Rouge.

 Entre las personas afro-americanas que viven con VIH en Luisiana, el 63% de las mujeres negras, el 60% de los hombres afro-americanos y casi tres cuartos de las mujeres transgénero viven en las regiones de Nueva Orleans y Baton Rouge.

Black Americans Living with HIV Infection in Louisiana by Public Health Region, 2017

	Mujeres afro-americanas	Hombres afro-americanos	Mujeres transgénero
Nivel Estatal	5,127 (100%)	9,611 (100%)	193 (100%)
1: New Orleans	1,544 (30%)	3,211 (33%)	98 (51%)
2: Baton Rouge	1,674 (33%)	2,603 (27%)	45 (23%)
3: Houma	215 (4%)	333 (3%)	8 (4%)
4: Lafayette	301 (6%)	648 (7%)	7 (4%)
5: Lake Charles	174 (3%)	405 (4%)	6 (3%)
6: Alexandria	211 (4%)	415 (4%)	3 (2%)
7: Shreveport	459 (9%)	995 (10%)	9 (5%)
8: Monroe	316 (6%)	535 (6%)	11 (6%)
9: Hammond/Slidell	233 (5%)	466 (5%)	6 (3%)

Para más información sobre NHBAAD visite nationalblackaidsday.org o hiv.gov.

Para más información sobre el VIH en Luisiana o para localizar un centro de pruebas de VIH, visite lahhub.org